

Gracias por elegir Duke Health para sus necesidades de atención médica. Su proveedor de salud ordeno un procedimiento de ligadura hemorroidal. Por favor revise esta información detalladamente antes de su cita para que esté preparado para el procedimiento. Si tiene preguntas llame a Duke GI al (919) 684-6437

¿Qué es un procedimiento de ligadura hemorroidal?

Un proveedor de atención médica realizará el procedimiento de colocación de ligadura hemorroidal en la clínica de gastroenterología. Se le colocará un pequeño instrumento en el recto, luego se coloca una pequeña banda elástica alrededor de la hemorroide. La mayoría de los pacientes no sienten dolor durante el proceso. La banda corta la circulación sanguínea de la hemorroide causando que esta se seque y se caiga de manera natural dentro de dos a cinco días. Es posible que note la banda en el inodoro después de haber defecado.

Información sobre el procedimiento:

No hay preparación para este procedimiento. No se le administrará sedación durante el proceso. No necesita un acompañante para su cita. No se permiten niños, haga arreglos para el cuidado de sus hijos. No se recomienda que viaje por tres semanas debido al pequeño riesgo de sangrado después de este procedimiento.

DOS SEMANAS (14 DIAS) ANTES DE LA LIGADURA HEMORROIDAL:

- Si toma anticoagulantes, llame a su proveedor de salud para que le apruebe suspender su medicamento.
 - Plavix necesita suspenderse por diez (10) días antes de su procedimiento.
 - Coumadin necesita suspenderse de cinco a siete (5-7) días antes de su procedimiento.

UNA SEMANA (7 DIAS) ANTES DE LA LIGADURA HEMORROIDAL:

- Si toma Aspirina de 81 mg a diario. Continúe tomándola.
- Deje de tomar estas medicinas siete días (7) antes de su procedimiento. Si toma cualquiera de estas medicinas durante los siete días antes del procedimiento su cita será reprogramada.
 - Aspirina (325 mg)
 - Advil® (ibuprofen)
 - Motrin® ibuprofen
 - Aleve® (Naproxen)
 - Vitamina E
 - Ibuprofen

