

INSTRUCCIONES DE PREPARACION PARA MANOMETRIA ESOFAGICA ESOPHAGEAL MANOMETRY STUDY

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones **CUATRO SEMANAS** antes de su cita para que se prepare bien. Si tiene diabetes llame a su proveedor de salud para obtener instrucciones sobre cómo tomar sus medicinas para el azúcar. **No necesita un conductor que lo acompañe, usted puede manejar a su cita.**

PRUEBA DE MANOMETRIA ESOFAGICA

Este estudio muestra el funcionamiento de los músculos del esófago. Una sonda se le introducirá por la nariz hasta llegar a su estómago. Se le aplicara medicina para anestesiarle la nariz y la garganta antes de introducir la sonda. La sonda mide la presión de los músculos del esófago mientras usted toma pequeños sorbos de agua. El estudio dura aproximadamente 10 minutos. Luego se le remueve la sonda. Puede tomar sus medicinas de rutina después del estudio a menos que este programado para un estudio de pH-metria esofágica (estudio de reflujo). El personal clínico le llamara con anticipación para confirmar sus medicinas antes de su cita.

DOS (2) a CUATRO (4) SEMANAS ANTES DEL ESTUDIO:

Es posible que deba suspender ciertos medicamentos antes de su estudio para obtener mejores resultados. Si toma alguno de los siguientes medicamentos, por favor llame al proveedor de salud que se los receta y pregunte si es seguro que los suspenda el día antes de su cita. **Note: No suspenda de inmediato antidepresivos tricíclicos, estos medicamentos deben reducirse gradualmente durante un periodo de 2 a 4 semanas.**

1 DIA ANTES Suspender solo si su proveedor de salud se lo aprueba	Antidepresivos tricíclicos DEBEN REDUCIRSE GRADUALMENTE DURANTE UN PERIODO DE 2-4 SEMANAS Elavil (amitriptyline) Tofranil (imipramine) Norpramin (desipramine) Agentes de Pro-Motilidad – “aceleran” el sistema digestivo Reglan (metoclopramide) Urecholine (bethanechol) Erythromycin Motilium (domperidone) Zelnorm (tegaserod)
Suspender solo si su proveedor de salud se lo aprueba	Antagonistas de Calcio – medicinas para el corazón/presión arterial Norvasc (amlodipine) Cardizem/Cartia (diltiazem) Adalat/Afeditab/Procardia/Nifediac (nifedipine) Calan/Covera/Isoptin/Verelan (verapamil) Nitratos – medicinas para el corazón/presión arterial Isordil (isosorbide dinitrate) Imdur (isosorbide mononitrate) Nitro-Dur patch/Nitropaste/Nitrostat (nitroglycerin) Narcóticos para el dolor Codeine Medicina para la tos que contenga codeine Duragesic Patch

Suspender solo si su proveedor de salud se lo aprueba	Parche Fentanyl Dilaudid (hydromorphone) Demerol (meperidine) Avinza/Kadian/Morphine Sulphate/MS Contin (morphine) Percocet/Oxycontin/Roxicodone (oxycodone) Sedativos benzodiazepinas Ativan (lorazepam) Librax (chlordiazepoxide/clidinium) Valium (diazepam)
DIA DEL ESTUDIO	Citas en la mañana: No coma ni beba nada después de la media noche antes de su estudio. Citas en la tarde: No coma ni beba nada 6-8 horas antes de su estudio. Puede consumir un desayuno ligero (pan tostado, jugo y yogurt) Medicamentos para la diabetes: Medicina oral (medicina para el azúcar) – No la tome antes de su cita. Insulina – Llame a su proveedor de salud y pida que le indique que dosis usar durante el tiempo que debe ayunar antes de su estudio.

Citas en la mañana:

- No coma ni beba nada después de la media noche antes de su cita.
- Vista ropa cómoda

Citas en la tarde:

- Puede consumir un desayuno ligero
- No coma ni beba nada 6-8 horas antes de su cita
- Vista ropa cómoda

Si tiene preguntas, por favor llame al Centro de Atención de Citas de Gastroenterología al 919-684-6437