

Manometría Esofágica con Prueba de Reflujo de 24 Horas

Esophageal Manometry with 24-Hour Reflux Testing

IMPORTANTE: Para estar bien preparado para esta prueba, por favor lea estas instrucciones CUATRO semanas antes de su manometría esofágica con prueba de reflujo de 24 horas.

El personal clínico del laboratorio de motilidad gastrointestinal le llamara antes de su cita para revisar esta información. Este estudio muestra que tan bien funcionan los músculos del esófago (“tubo de deglución”). Se introducirá una pequeña sonda a través de su nariz hasta llegar a su estómago. La enfermera aplicara un gel anestésico en su nariz y la parte posterior de la garganta antes de colocarle la sonda. La sonda mide la presión en el esófago mientras bebe pequeños sorbos de agua. Esta prueba dura aproximadamente 15 minutos. Luego se le retira la sonda.

Después de completar la prueba de manometría esofágica, se le colocara una segunda sonda. Esta sonda estará conectada a un dispositivo de grabación, el cual se llevará a casa por 24 horas.

Una vez que la sonda este colocada, se le dejara ir. Podrá resumir sus actividades normales y seguir su dieta habitual. Regresara al laboratorio después de 24 horas para que la enfermera le retire la sonda y entregue el dispositivo de grabación.

Es muy importante que pregunte a su médico si debe suspender o continuar con sus medicinas para bloquear la acidez.

- Si le indica continuar sus medicinas para reducir la acidez -siga tomándolos como acostumbra.
- Si se le indica suspender sus medicinas para reducir la acidez, por favor revise las instrucciones a continuación.

Si toma medicinas para la diabetes:

- Si usa insulina – llame a su médico para recibir instrucciones sobre la dosis durante el ayuno, antes y durante la prueba.
- Medicina oral para la diabetes (pastillas para el azúcar) – No tome estas medicinas el día de su cita.

DOS (2) a CUATRO (4) SEMANAS ANTES DE SU PRUEBA:

Deberá suspender algunas medicinas para obtener mejores resultados. Si toma alguno de los medicamentos mencionados a continuación, llame a su médico y consulte si está bien dejar de tomarlos antes de su prueba de manometría.

Nota: ¡No suspenda de inmediato medicamentos antidepresivos tricíclicos! Estos medicamentos deben reducirse gradualmente durante un periodo de 2 a 4 semanas.

EL DIA DE SU PRUEBA:

No coma ni beba nada seis (6) horas antes de esta prueba.

Use ropa suelta y cómoda.

No use vestido ni prendas de una sola pieza.

No recibirá sedación, por lo que NO necesitará un conductor.

Llegue 30 minutos antes de la hora de su cita para registrarse.

EL DIA DE SU PRUEBA:

Medicinas para la diabetes: No tome pastillas para la diabetes antes de su prueba.

Llame a su médico para recibir instrucciones sobre la dosis de insulina durante el ayuno, antes y durante la prueba.

<p>DE DOS (2) A CUATRO (4) SEMANAS ANTES DE LA PRUEBA:</p>	<p>Deberá suspender algunos medicamentos para obtener mejores resultados. Si toma alguno de los medicamentos mencionados a continuación, llame a su médico para preguntar si puede dejar de tomarlo(s) el día antes de su prueba de manometría.</p>
<p>CINCO (5) DIAS ANTES DE LA PRUEBA</p> <p>Suspenda estos medicamentos si el medico se lo indica</p>	<p>PPIs (Inhibidor de la bomba de protones – Reductor de reflujo ácido):</p> <p>Aciphex (rabeprazole) Dexilant (dexlansoprazole) Nexium (esomeprazole) Prevacid (lansoprazole) Prilosec (omeprazole) Protonix (pantoprazole)</p>
<p>UN (1) DIA ANTES DE LA PRUEBA</p> <p>Suspenda estos medicamentos si el medico se lo indica</p>	<p>Bloqueadores H2 (Reductores de reflujo ácido):</p> <p>Axid (nizatidine) Pepcid (famotidine) Tagamet (cimetidine) Zantac (ranitidine)</p> <p>Antidepresivos tricíclicos – requieren reducción gradual de 2 a 4 semanas</p> <p>Elavil (amitriptyline) Tofranil (imipramine) Norpramin (desipramine)</p> <p>Agentes pro-motilidad – Aceleran el sistema digestivo</p> <p>Reglan (metoclopramide) Urecholine (bethanechol) Erythromycin Motilium (domperidone) Zelnorm (tegaserod)</p>
<p>UN (1) DIA ANTES DE LA PRUEBA</p> <p>Pueden suspenderse si el medico lo aprueba</p>	<p>Calcium Channel Blockers – heart/blood pressure medicine</p> <p>Norvasc (amlodipine) Cardizem/Cartia (diltiazem) Adalat/Afeditab/Procardia/Nifediac (nifedipine) Calan/Covera/Isoptin/Verelan (verapamil)</p> <p>Nitrates – heart/blood pressure medicine</p> <p>Isordil (isosorbide dinitrate) Imdur (isosorbide mononitrate) Nitro-Dur patch/Nitropaste/Nitrostat (nitroglycerin)</p> <p>Narcotic Pain Medications</p> <p>Codeine Medicinas para la tos con codeína Duragesic Patch Fentanyl Transdermal Patch Dilaudid (hydromorphone) Demerol (meperidine) Avinza/Kadian/Morphine Sulphate/MS Contin (morphine) Percocet/Oxycontin/Roxicodone (oxycodone)</p>

<p>UN (1) DIA ANTES DE LA PRUEBA</p> <p>Pueden suspenderse si el medico lo aprueba</p>	<p>Sedantes benzodiazepinicos Ativan (lorazepam) Librax (chlordiazepoxide/clidinium Valium (diazepam)</p>
<p>EL DIA DE LA PRUEBA</p>	<p>No coma ni beba nada seis (6) horas antes de su prueba. Use ropa suelta y cómoda. No use vestido ni prendas de una sola pieza. No recibirá anestesia, por lo tanto, no necesita que lo acompañe un conductor. Llegue 30 minutos antes de la hora de la cita para registrarse.</p> <p>Medicamentos para la diabetes: No tome pastillas para la diabetes antes esta prueba. Llame a su médico para recibir instrucciones sobre la dosis de insulina durante el ayuno, antes y después de la prueba.</p>
<p>EL DIA DESPUES DE LA PRUEBA</p>	<p>Regrese a la clínica a la hora que le programen su segunda cita. La enfermera le retirara la sonda y el dispositivo de grabación.</p>

Llame a Duke GI si tiene preguntas sobre su cita o el procedimiento (919) 684-6437